



A.S.L. TO5

Azienda Sanitaria Locale
di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
S.C. IGIENE E SANITA' PUBBLICA
Sede Distrettuale di Nichelino- Moncalieri
via San Francesco d'Assisi 35 10042 NICHELINO
tel. 011.6806872. fax 011. 0589876
e-mail: sisp.nichemonca@aslto5.piemonte.it
sito internet: www.aslto5.piemonte.it

Sede Legale – Via S. Pellico, 1 – 10023 Chieri (To) – tel. 011 94291 – C.F. e P.I. 06827170017

Prot. n. 51104 Nichelino 25/11/2015

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici

Scuole Medie ASL TO5

Oggetto: Vaccinazione antivaricella coorte 2005

Da qualche anno la Regione Piemonte, come altre regioni italiane, ha avviato la vaccinazione antivaricella con offerta attiva e gratuita del vaccino ai ragazzi nell'undicesimo anno di età, che **non hanno ancora superato la malattia.**

La varicella è una comune malattia dell'infanzia causata dal virus della varicella-zoster (VZV). Il virus si trasmette da persona ammalata ad una persona sana attraverso le goccioline emesse con la respirazione o il contatto delle vescicole-pustole della pelle. La varicella di solito è una malattia lieve, ma può essere grave e rarissimamente anche mortale, specialmente quando colpisce bambini molto piccoli o gli adulti. La malattia si presenta di solito con febbre, malessere generale e una tipica eruzione della pelle che inizia dalla faccia e il capo e si estende al tronco e al resto del corpo. L'eruzione della pelle è caratterizzata da delle papule che si trasformano poi in vescicole-pustole e croste di solito accompagnate a prurito. Un bambino di solito presenta da 300 a 500 lesioni della pelle durante l'infezione.

La varicella può causare sovrainfezioni batteriche delle pustole, cicatrici cutanee, artriti, polmonite (23 ogni 10.000 casi), danni cerebrali (più di 1 ogni 10.000 casi), trombocitopenia, e infiammazione del cervelletto che può causare un'insufficiente coordinazione muscolare (atassia cerebellare). Le complicazioni sono più frequenti nei bambini nel 1° anno di vita, negli adulti e nelle persone con deficit immunitari. Quando la varicella colpisce una donna negli ultimi giorni della gravidanza, si può avere l'infezione del neonato che provoca una forma molto estesa e grave con la morte del 30% dei bambini.

Oggi è disponibile un vaccino per prevenire la malattia. Il vaccino è utilizzabile a partire dal 13° mese di vita.

Stante le considerazioni sopra esposte **chi dovrebbe essere vaccinato?**

- Gli adolescenti e i giovani adulti che non si sono ancora ammalati di varicella
- Le donne che non si sono ancora ammalate di varicella, specialmente se lavorano a contatto con i bambini (maestre, educatrici) o a contatto con i malati.
- I familiari conviventi di persone suscettibili alla malattia con difese immunitarie ridotte, che non si sono ancora ammalati di varicella,.
- Le persone ad alto rischio non immuni che sono venute a contatto con malati di varicella: la vaccinazione eseguita entro 72 ore (3 giorni) può prevenire lo sviluppo della malattia.

I soggetti nati nell'anno 2005, **che non sono stati vaccinati contro la varicella** o che **non hanno superato la malattia** (e quindi a rischio di contrarla con maggiori complicanze) saranno contemporaneamente invitati alla vaccinazione.

Pertanto si richiede la Vs. collaborazione affinché si informino i genitori degli alunni frequentanti la classe 1° media del vostro Istituto a presentarsi per la somministrazione del vaccino:

GIORNO: Lunedì 12 Dicembre 2016 dalle ore 13:15 alle ore 15:30
presso il centro vaccinale ASL TO5 di Via S. F. D'Assisi N° 35 Nichelino

Si ringrazia per la collaborazione e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Direttore della S.C.
Igiene e Sanità Pubblica ASLTO5
Dr. Giuseppe Valenza

